

Bijnier App vernieuwd voor iPhone en iPad

De nieuwe versie 1.4.0 is te vinden in de App Store. De versie voor Android volgt later. Wat is er gewijzigd:



Het patiënten portaal en het dagboek zijn verwijderd aangezien de patientportalen van de ziekenhuizen met Digid geopend moeten worden en het dagboek niet goed werkte (en in Android niet beschikbaar is).

De nieuwste versie van het ambulance protocol (LPA9) voor bijnierschorsinsufficiëntie is toegevoegd, alsmede de instructie voor de noodinjectie:

12:06

< Vorige Ambulance Protocol

Bijnierschorsinsufficiëntie

gediagnosticeerd met bijnierschorsinsufficiëntie

symptomen (Addison) crisis

- acute buikpijn
- braken
- hypoglykemie
- hypotensie
- koorts
- misselijkheid
- verminderd bewustzijn

(Addison) crisis

eigen medicatie / dosering patiënt (Solucortef®)

hydrocortison →
indien i.v. niet lukt i.m.

i.v.	< 1 jaar	25 mg
i.v.	1 - 6 jaar	50 mg
i.v.	> 6 jaar	100 mg
i.v.		100 mg

transfer professional / behandelaar

muitige tot ernstige lichamelijke stress of ernstige psychische stress

eigen medicatie / dosering patiënt (stress-schema)

hydrocortison →
indien eigen medicatie niet aanwezig

i.m.	< 1 jaar	5 mg
i.m.	1 - 6 jaar	10 mg
i.m.	> 6 jaar	25 mg
i.m.		25 mg

12:07

< Vorige Noodinjectie

Noodinjectie bij een bijnierschorsinsufficiëntie

Wat moet u doen als er een bijnierschorsinsufficiëntie dreigt?
Hoe vaak is een noodinjectie nodig?
En hoe spuit je de dosering?

Voor meer informatie raadpleeg www.bijniermet.nl/en/zoek-op-animatie,
<https://www.bijniermet.nl/nederlands/noodinjectie-algemeen/>

1 Haal het vial uit de tas van de patiënt. De vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

2 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

3 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

4 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

5 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

6 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

7 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

8 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

9 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

10 Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast. Het vial zit anderszins vast.

Verder is de stress calculator gesplitst in een versie voor volwassenen en een voor kinderen. De geboortedatum, ingevuld bij persoonlijke gegevens, is leidend voor de pop-ups en de opmerkingen die verschijnen:

12:07

< Voornaam Achternaam (Vrouw)

Je bent 4 jaar oud.
Gebruik het schema voor kinderen.

Dag dosering Hydrocortison

Morgen	5 mg
Middag	0 mg
Avond	0 mg
Nacht	15 mg
Totaal per dag	20.0 mg

Stressinstructies Hydrocortison

Stressinstructies Cortison-acetaat

Stressinstructies Prednis(ol)on

Stressinstructies Dexamethason

Stressschema bij ingreep of operatie

12:07

< Voornaam Achternaam (Vrouw)

De berekening is gebaseerd op je leeftijd: 4 jaar

Dag dosering Hydrocortison

Morgen	5 mg
Middag	0 mg
Avond	0 mg
Nacht	15 mg
Totaal per dag	20.0 mg

In geval van gematigde stress

dosering 3 x verhogen **60.0 mg**

Drie maal daags 1 dosis van **20 mg**

In geval van zware stress

dosering 5 x verhogen **100.0 mg**

4x daags 1 dosis van **25 mg**

Stress schema - Thuis situatie

Stress schema - Ingreep en Operatie